M. Ducros Eleve de L'Ecole pratique a
presenté à L'academie deux instrumens de
Son invention pour faire La résection des
amygdales: Le premier Consiste en un tige
d'acier monté sur un manche; cette tige vers
Les deux tiers de Sa Longueur Est recourbée En
forme d'Equerre Et Se termine par une plaque
ovale; sur cette plaque est ajusté un morceau
de Liège qui y est fixé: Cet instrument est
destiné à tenir la bouche ouverte En appliquant
le morceau de Liège Entre Les dens molaires
postérieures. L'autre instrument, avec lequel
la résection des amygdales doit être faite,
Et auquel l'auteur, à raison de Son usage, a
donné Le nom d'<u>amygdalatôme</u>, Est composé
de deux pieces principales distinguées En mâle
Et en femelle, Longues d'Environ Six pouces,
de figure quarrée, terminée chacune à une
de Leur Extremité par deux anneaux pour
les pouvoir tenir: Ces deux branches Sont
unies L'une à L'autre par deux petits anneaux

ARC 53 n° 91

qui Embrassent la branche mâle Et Sont fixés à la branche femelle de façon que cette dernière branche peut Se mouvoir Et glisser Sur l'autre branche: l'autre Extrémité de la branche mâle, qui est la plus longue, est recourbée à Angle droit Et est entaillée par une rainure propre à recevoir une lame tranchante formée par l'autre Extrémité de la branche femelle: Telle est la description Succinte de cet instrument.

Pour S'en Servir, on place d'abord L'instrument garni de Liége Entre les dens molaires posterieures, afin de tenir la bouche ouverte, Et on en fait tenir le manche par un aide; Ensuite on prend l'instrument avec lequel on doit opérer; on le porte jusqu'à l'amygdale qu'on veut couper; on retire à Soi la branche femelle à l'Extrémité de laquelle est la lame tranchante, En la faisant glisser Sur la branche mâle; on passe derrière l'amygdale la portion recourbée de la branche mâle pour Servir de point d'appui à la glande;

Et avec le pouce introduit dans l'anneau, on pousse la branche femelle pour Couper l'amygdale en appuiant dessus: Tel est Le procédé opératoire de M. Ducros

il est aisé d'apprétier cet instrument au premier coup d'œil; il ne peut remplir, comme il faut, les Vues pour les quelles on l'emploïe: on ne S'est jamais Servi de l'instrument tranchant pour couper les parties molles de la manière dont agit celuicy: Personne n'ignore que pour diviser les parties, l'instrument doit être dirigé comme une Scie, Et que par ce moyen l'incision Se fait plus facilement Et avec moins de douleur parcequ'il ne meurtrit ni ne contond: Si l'on appuie Seulement la main Sur un tranchant le mieux affilé, il ne pénétrera pas; ni Si legerement qu'on le fasse agir, comme une Scie, il pénétrera avec la plus grande facilité: La Lame Située à L'Extremité de la branche femelle de L'instrument de M. Ducros est un Véritable Ciseau qui ne peut agir qu'en meurtrissant Et Contondant les parties Sur les quelles on l'applique; Deplus il ne peut Séparer complettement la portion de L'amygdale qu'on Veut Exciser, Car le tranchant

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

delalame ne pénétrant point jusqu'au fond de la rainure pratiquée dans la partie recourbée de de la branche mâle, les parties molles qui sont poussées en avant dans cette rainure ne seront point coupées et l'incision restera imparfaite. Tous ces défauts sont trop Essentiels pour admettre cet instrument, et il ne prevaudra jamais sur les moyens qui ont été Emploiés jusqu'à présent pour faire la résection des amygdales. Si M. Ducros a pu se tromper dans cette nouvelle production, son Zele pour le progrès de L'art ne se ralentira pas; et ses reflexions meuries par le tems et L'Expérience le mettront de plus En plus à portée d'approcher de la perfection.

Lesne